Laboratorio de Microbiología Clínica

Coprocultivo
Indicaciones para la toma de muestras

Buscar en el laboratorio el material necesario para la toma de muestras.

En pacientes pediátricos:

1. Tan pronto como defeque el bebé, tomar del pañal con el hisopo provisto, materia fecal de las zonas más "feas" (donde se observan moco o sangre si hay).
2. Destapar el tubo, introducir el hisopo cargado con la muestra y ajustar el tapón.
3. Acercar al laboratorio el pañal y el tubo con la muestra lo más pronto posible.
4. No son aptas las muestras de pañales que además tienen orina. Se sugiere cambiar al bebé antes de la toma de muestra para que el pañal sólo tenga materia fecal.
5. Contestar el cuestionario correspondiente y presentarlo junto con la muestra.

En pacientes adultos y niños que no usan pañal:

1. Defecar en un recipiente seco.
2. Tomar con el hisopo provisto materia fecal de las zonas más "feas" (donde se observan moco o sangre si hay).
3. Destapar el tubo, introducir el hisopo cargado con la muestra y ajustar el tapón.
4. Recolectar otro poco de materia fecal en el frasco seco provisto.
5. Acercar al laboratorio el frasco **y** el tubo con la muestra lo más pronto posible.
6. **No son aptas las muestras tomadas de inodoros.**
7. Contestar el cuestionario correspondiente y presentarlo junto con la muestra.

Laboratorio de Microbiología Clínica

Apellidos:	HC:
Nombres:	NE:
Fecha de nacimiento:	Fecha:

CUESTIONARIO PARA COPROCULTIVO

¿Es la primera vez que realiza este estudio?

¿Estás utilizando o has utilizado últimamente alguna medicación? ¿Cuál?

¿Ha viajado últimamente? ¿A dónde?

¿Tiene vómitos?

¿Tiene dolores abdominales?

¿Tiene fiebre?

¿Cuánto tiempo lleva con los síntomas?

¿Ha hecho modificaciones en el tipo de alimentación últimamente?

¿Hay alguna otra información que considere importante?